





CLIMA PROMEDIO PROVINCIAL

Chimborazo

La precipitación promedio referencial se registró en 7 mm, lo que representó una disminución de 84% al comparar con el mes anterior; mientras que, al revisar el promedio histórico, se observó una baja del 59%.




La temperatura promedio en la provincia durante este mes se registró en 14 °C, disminuyendo en 2% respecto al mes anterior. Por otro lado, al comparar con el promedio histórico, se incrementó en 1%.




Cotopaxi

La precipitación se registró en 9 mm, disminuyendo en 82% al comparar con el mes de junio, pasando de 50 mm a 9 mm. Con relación al valor normal, se observó una reducción de 42%.




La temperatura promedio referencial se registró en 14 °C, sin reportar variación con relación al mes anterior. En el valor normal para el mes de julio se obtiene una temperatura promedio de 13 °C, lo que representa un aumento de 2°C.

A nivel provincial la precipitación disminuyó, provocando la utilización de riego durante este mes; además, el descenso de la temperatura ocasionó un retraso en la maduración de los cultivos bajo invernadero, como es el caso del tomate riñón.




Pastaza

La precipitación promedio se registró en 262 mm, lo que significó una baja de 55% al comparar con el mes anterior. De igual manera se observa al analizar el promedio histórico, donde se presentó un descenso de 27%.



La temperatura promedio en la provincia se reportó en 21 °C, lo que presentó una disminución de 1% respecto al mes anterior. Sin embargo, al comparar con el valor normal, se obtuvo un incremento de 3% (0.5 °C).





La disminución de la precipitación afectó directamente a la renovación del pasto para la alimentación de ganado bovino. Esta condición climática favoreció la maduración de las plantaciones de caña de azúcar.

Precipitación y Temperatura

Tungurahua

La precipitación promedio se registró en 29 mm, lo que representó una disminución de 64% al comparar con el mes anterior. En cuanto al valor normal, se observó una reducción de 25%. Factor que favoreció a un impacto positivo en la producción de frutales en el cantón de Baños.

La temperatura promedio referencial se registró en 12 °C, lo que representó una disminución del 2% respecto al mes anterior. Al revisar los datos del valor normal se obtiene una temperatura promedio de 11 °C, lo que significa un aumento del 3%.



CLIMA A NIVEL ZONAL

PRECIPITACIÓN (mm)							
Provincias/Estación	2015.Julio. (t-12)	2016.Junio. (t-1)	2016.Julio. (t)	Pre. Pro. Acu. (2016)	Pre. Pro. Acu. (2015)	Δt/t-12	Δt/t-1
Chimborazo	37.8	45.2	7.1	334.9	329.1	-81.2%	-84.3%
Riobamba Aer.	37.8	45.2	7.1	334.9	329.1	-81.2%	-84.3%
Cotopaxi	20.5	49.6	8.9	297.4	267.6	-56.8%	-82.1%
Latacunga Aer.	6.5	44.8	8.7	306.2	270.0	33.8%	-80.6%
Rumipamba	34.5	54.3	9.0	288.5	265.1	-73.9%	-83.4%
Pastaza	487.1	575.2	261.6	3,112.9	3,521.5	-46.3%	-54.5%
Pastaza Aer.	479.1	582.1	272.4	3,056.9	3,641.4	-43.1%	-53.2%
Puyo	495.1	568.2	250.8	3,168.9	3,401.6	-49.3%	-55.9%
Tungurahua	109.5	79.7	28.6	388.5	428.7	-73.9%	-64.2%
Ambato Aer.	119.5	72.6	19.7	377.0	391.6	-83.5%	-72.9%
Querochaca	99.5	86.8	37.4	400.0	427.7	-62.4%	-56.9%

TEMPERATURA (°C)					
Provincias/Estación	2015.Julio. (t-12)	2016.Junio. (t-1)	2016.Julio. (t)	Δt/t-12	Δt/t-1
Chimborazo	14.3	14.1	13.8	-3.2%	-2.1%
Riobamba Aer.	14.3	14.1	13.8	-3.2%	-2.1%
Cotopaxi	13.5	13.5	13.5	-0.2%	0.0%
Latacunga Aer.	12.7	13.2	13.4	5.3%	1.5%
Rumipamba	14.3	13.8	13.6	-5.1%	-1.4%
Pastaza	21.8	21.5	21.2	-2.8%	-1.2%
Pastaza Aer.	21.9	21.3	21.2	-3.0%	-0.5%
Puyo	21.7	21.6	21.2	-2.5%	-1.9%
Tungurahua	13.6	12.2	12.0	-11.8%	-1.6%
Ambato Aer.					
Querochaca	13.6	12.2	12.0	-11.8%	-1.6%

Nota: Los promedios provinciales presentados en las tablas y gráficos son referenciales, para un dato más exacto considerar la información de la estación más cercana.

Fuente: INAMHI. Elaborado por: MAGAP- CGSIN.