

La hacemos todos!




CLIMA PROMEDIO PROVINCIAL

Carchi

La precipitación promedio se registró en 53 mm, lo que representó un descenso de 7% a comparación con el mes anterior (julio). Por otra parte, al analizar el promedio histórico de precipitaciones, se observó un aumento de 53%.


CARCHI



Dicho descenso favoreció la producción y cosecha de arveja tierna en vaina y mora de castilla en la provincia. En consecuencia, la oferta de los productos en mención aumentaron, lo que se evidenció con la disminución de los precios a nivel de productor en 49% y 17%, respectivamente.

La temperatura promedio del aire, en las estaciones, se registró en 11.2 °C, lo que significó un aumento del 2% en la temperatura promedio del aire respecto al promedio del valor normal. Al contrario, al comparar con el mes pasado descendió en 1%.

CARCHI




El descenso en la temperatura, con relación al mes pasado, perjudicó la producción agrícola, específicamente a los cultivos de cebolla colorada nacional seca, cebolla perla nacional seca y fréjol rojo tierno en vaina. La oferta de los productos en los mercados de influencia disminuyó y como consecuencia, los precios a nivel de productor aumentaron en 5%, 6% y 4%, respectivamente.

Esmeraldas

Según la estación meteorológica ubicada en la provincia, la precipitación promedio fue de 22.70 mm, lo que representó un aumento de 11,250% comparada con el mes anterior, al pasar de 0.20 mm en julio a 22.70 mm en agosto. Situación similar se produjo al cotejar con el valor normal, en la cual su crecimiento alcanzó el 89%, al variar de 12 mm en el período histórico a 22.70 mm en el presente mes.


ESMERALDAS



El descenso de las lluvias fue favorable para la producción de maracuyá, lo que incrementó la oferta del producto a nivel de mercados y bodegas comerciales; en consecuencia, los costos a nivel de productor disminuyeron en 16%.

En la provincia, la temperatura promedio registró un valor referencial de 26.3 °C, lo que significó un aumento del 1% en la temperatura promedio del aire respecto al promedio del valor normal.

ESMERALDAS




La estabilidad en la temperatura promedio del aire en la provincia afectó negativamente la producción de cacao fino de aroma y palma de aceite, especialmente la que se encontraba en fase fenológica de maduración y cosecha; por lo que, la oferta del citado producto disminuyó en los centros de comercialización, lo que se evidenció en el crecimiento del 3% y 1%, respectivamente en los precios a nivel de productor.

Precipitación y Temperatura


Imbabura

Los registros en la estación meteorológica ubicada en la provincia revelan que en promedio, las precipitaciones durante el presente mes fueron de 21 mm, lo que representó un aumento de 661% al compararla con el mes anterior; pasando de 3 mm en julio a 21 mm en agosto. Al cotejar con el promedio del valor normal, se reportó un aumento de 9%, al pasar de 20 mm a 21 mm en el presente mes.



En la provincia, el aumento de las lluvias registradas en la estación fue negativo para la producción de fréjol tierno en vaina gema, fréjol tierno en vaina cargabello y fréjol tierno en vaina paragache; en especial para los cultivos que se encontraban en fase vegetativa de maduración fisiológica. La oferta de los productos en los mercados disminuyó, lo que se evidenció en el aumento de los precios a nivel de mercado en 28%, 8% y 8%, respectivamente, con relación a julio del año en curso.


La temperatura promedio que se reportó en la estación meteorológica de la provincia fue de 10.8 °C, lo que significó un equilibrio térmico en el aire con relación al mes pasado; sin embargo, respecto al promedio del valor normal alcanzó un crecimiento del 5%, pasando de 10.3 °C a 10.8 °C.



Las condiciones de temperatura favorecieron la maduración fisiológica de los cultivos de caña de azúcar y tomate riñón de invernadero, lo que provocó un incremento de la oferta de los productos en mercados e ingenios azucareros. Los precios a nivel de productor disminuyeron en 11% y 1%, respectivamente.


Sucumbíos

Las precipitaciones registradas en la estación meteorológica indican que alcanzaron los 169 mm, lo que representó un descenso de 31% al compararla con el promedio del valor normal; al pasar de 244 mm en a 169 mm.



En la provincia, el descenso en las lluvias respecto al valor normal afectó la producción de cacao CCN51, por lo que su precio a nivel de productor aumentó en 3%, a pesar que en Reino Unido (mercado internacional) la tasa de cambio del grano de cacao disminuyó.

Por otro lado, la disminución en las precipitaciones perjudicó la mano de obra destinada a la actividad de labores culturales (podas, desyerbas, entre otras) y cosecha de los cultivos priorizados, por lo que los precios por estas prestaciones de servicios disminuyeron en 0.05% y 1%, respectivamente.



La estación meteorológica de Lago Agrio Aeropuerto registró un valor de 26.5 °C. (un aumento del 4% al compararlo con el promedio del valor normal). Este acontecimiento climático afectó a la producción de café, lo que generó una disminución en la oferta en las bodegas y mercados; en consecuencia, los precios a nivel de productor aumentaron en 1% (en el mercado internacional el café disminuyó en 1%).

PRECIPITACIÓN (mm)

Provincias/Estación	2016.Ago. (t-12)	2017.Jul. (t-1)	2017.Ago. (t)	Pre. Acu. (2016)	Pre. Acu. (2017)	$\Delta t/t-12$	$\Delta t/t-1$
Carchi	10.6	57.4	53.1	303.6	687.0	403%	-7%
El Ángel	-	-	-	248.2	-	-	-
San Gabriel	10.7	57.4	53.1	350.0	722.2	396%	-7%
Tulcan Aer.	10.4	-	-	241.6	651.8	-	-
Esmeraldas	1.8	0.2	22.7	1.142.9	822.1	1161%	11250%
Esmeraldas Aer.	1.8	0.2	22.7	844.1	822.1	1161%	11250%
Muisne	-	-	-	1.429.6	-	-	-
Imbabura	0.1	2.8	21.3	496.9	1.046.3	21200%	661%
Ibarra	-	-	-	283.2	-	-	-
Inguincho	0.1	2.8	21.3	719.6	1.046.3	21200%	661%
Otavaló	-	-	-	289.7	-	-	-
Sucumbios	138.3	-	168.8	1.240.5	1.800.3	22%	-
Lago Agrio Aer.	138.3	-	168.8	1.240.5	1.800.3	22%	-

En dos de las cuatro estaciones meteorológicas distribuidas en las provincias reportaron incrementos en las precipitaciones. Las estaciones ubicadas en los cantones Esmeraldas y Otavaló fueron las que registraron los incrementos más considerables en la zona. En Esmeraldas favoreció la maduración de maracuyá; precios a nivel de productor disminuyeron en 16%. En Otavaló fue beneficioso para la producción de tomate riñón de invernadero, evidente con la caída del 11% en el precio a nivel de productor.

TEMPERATURA (°C)

Provincias/Estación	2016.Ago. (t-12)	2017.Jul. (t-1)	2017.Ago. (t)	$\Delta t/t-12$	$\Delta t/t-1$
Carchi	11.9	11.3	11.2	-5%	-1%
El Ángel	-	-	-	-	-
San Gabriel	12.0	11.3	11.2	-7%	-1%
Tulcan Aer.	11.7	-	-	-	-
Esmeraldas	26.3	26.3	26.3	0%	0.0%
Esmeraldas Aer.	26.3	26.3	26.3	0%	0.0%
Muisne	-	-	-	-	-
Imbabura	11.7	10.8	10.8	-8%	0%
Ibarra	-	-	-	-	-
Inguincho	11.7	10.8	10.8	-8%	0%
Otavaló	-	-	-	-	-
Sucumbios	26.0	-	26.5	1.9%	-
Lago Agrio Aer.	26.0	-	26.5	1.9%	-

Por otro lado, la estación ubicada en el cantón Montúfar (1%) reveló el descenso más marcado en la temperatura promedio del aire. Acontecimiento climático que afectó la producción de cebolla colorada seca y limpia, cebolla perla seca y limpia y fréjol rojo tierno en vaina, consecuentemente los precios a nivel de productor aumentaron en 5%, 6% y 3%, respectivamente.

Nota: Los promedios provinciales presentados en las tablas y gráficos son referenciales, para un dato más exacto considerar la información de la estación más cercana.

Fuente: INAMHI. **Elaborado por:** MAG- CGSIN.